

VLOOIEN BIJ HOND EN KAT : EEN IRRITEREND PROBLEEM !!

Vlooien zijn op onze huisdieren levende parasieten die veel overlast kunnen veroorzaken bij dier en mens. De overlast (jeuk) ontstaat doordat met name de vrouwelijke vlooien een bloedmaaltijd nodig hebben voordat ze eieren leggen. De beten veroorzaken irritatie en ontstekingsreacties, maar kunnen ook bij sommige mensen en dieren tot allergische reacties leiden, die gepaard gaan met zeer heftige jeuk (zie ook ons stencil vlooiënallergie).

De levenscyclus van de vlo bestaat uit 4 stadia (zie schema).

1) De volwassen vlo

Op onze huisdieren komt voornamelijk de kattenvlo voor. Deze vlo leeft vrijwel permanent op hond en kat en legt gedurende 100 dagen ongeveer 2000 eieren. Vlooien zitten bij voorkeur achter op de rug en op de buik van hond en kat en veroorzaken daar jeuk. Vlooien produceren uitwerpselen die in de vorm van kleine zwarte korreltjes in de vacht zijn te vinden. Vlooien zijn niet bestand tegen lage temperaturen en een lage luchtvochtigheid.

2) De eieren

Vlooieneieren vallen vrijwel allemaal van het dier af en komen daar terecht waar het dier zich ophoudt. Dit betekent dat vooral de ligplaatsen van onze huisdieren, mand, dekens, bank, (auto)stoelen en vloerbedekking broedplaatsen zijn van nieuwe vlooien. Vergeet echter ook de leefomgeving buiten niet ! Met de moderne middelen (groeiremmers zoals methopreen) zijn we in staat de eieren onschadelijk te maken.

3) De larven

Larven van vlooien zijn 2-5 mm lang, leven op de grond en in de nabijheid van de eieren. Ze voeden zich met vlooiënontlasting en organisch afval. Larven zijn lichtschuw en kruipen actief in de vloerbedekking, in kieren en spleten of buiten onder bladeren e.d. Larven zijn niet bestand tegen een lage temperatuur en een lage luchtvochtigheid. Zij gedijen goed op vochtige donkere plekken. Met moderne middelen als lufenuron en fenoxycarb kunnen we heel specifiek de larven onschadelijk maken.

4) Het pop stadium

Tijdens dit stadium is de jonge vlo omgegeven door een dikke ondoordringbare wand, waardoor hij goed beschermd is tegen invloeden van buiten, zoals bijv. insecticiden. In dit stadium blijft de vlo zo'n 150 dagen vitaal. Komt een huisdier of mens in de buurt dan zullen uit deze poppen massaal nieuwe vlooien komen. Poppen zijn alleen te bestrijden door herhaald stofzuigen en herhaaldelijk toepassen van insecticiden.

De bestrijding

Bij hardnekkige vlooiënproblemen moeten we de vlooien op 3 fronten **tegelijk** en **herhaaldelijk** bestrijden:

- a. **bestrijding van volwassen vlooien op het dier en op alle contactdieren**
- b. **bestrijding van de eieren**
- c. **bestrijding van de larven in de leefomgeving**

Alleen op deze manier bereiken we het beste effect !!

Dit betekent dat we de volgende middelen **tegelijkertijd en herhaaldelijk** moeten inzetten :

Voor op de hond: ProMeris, Pulvex, Stronghold en Pratic.

Voor in huis; herhaaldelijk stofzuigen met verwijdering van de stofzak uit huis en zorgvuldig sprayen met tetramethrin + permethrin (bv. **IndoorX**).

Voor op de kat : ProMeris, Stronghold, Effipro en Program in injectievorm.

Voor in huis; herhaaldelijk stofzuigen met verwijdering van de stofzak uit huis en sprayen met **IndoorX**

Stronghold doodt de vlo en andere uitwendige parasieten (uitgezonderd de teek), maar daarnaast ook alle wormen (uitgezonderd de lintworm) en bij de kat is het tevens effectief tegen oormijten. Het is een uitgesproken veilig middel en is vanwege het brede werkzame gebied uitermate geschikt voor kittens (3 vliegen in een klap).

Wanneer je er vanuit gaat de hond en kat 4 x per jaar ontwormd dienen te worden, dan is het te adviseren om dit met Stronghold te doen. De overige maanden van het jaar kan ProMeris, Pulvex of Effipro gebruikt worden tegen de vlooiën.

WAARSCHUWING

Middelen zoals Bolfo druppels, Cyflee-tabletten en Vectocyte voor door het eten zijn middelen die via de bloedbaan werken, deze middelen zijn veel te giftig en kunnen zeker bij langdurig gebruik leiden tot lever- en nieraandoeningen. Ze zijn zeker voor drachtige en zogende dieren af te raden en met puppies en kittens dient men t.a.v. deze middelen ook zeer voorzichtig te werk te gaan. Jaarlijks maken we een paar maal ernstige vergiftigingsgevallen mee ten gevolge van deze middelen, niet zelden met een fatale afloop.

Buitenshuis dient u waar mogelijk de schaduwrijke schuilplaatsen voor de larven op te ruimen : dat betekent dorre bladeren, takken e.d weghalen. Wees attent op andere honden en katten of zwerfdieren : zij kunnen de leefomgeving van uw dier opnieuw besmetten. In dit verband zijn ook uitlaatveldjes berucht. De bodem kan hier fors met eieren en larven besmet zijn.

Biergist of knoflooktabletten zijn niet werkzaam. De waarde van een vlooiënbandje is gering en wordt daarom door ons niet aanbevolen.

Mocht u naar aanleiding van deze tekst nog vragen hebben dan zijn wij daarvoor bereikbaar.

Wij wensen u veel succes bij de vlooiënbestrijding!